

ПАМЯТКА

пациента, получившего стоматологическое лечение с применением дентальных имплантатов



Благодарим Вас за выбор ГАУЗ «СП № 56 ДЗМ» для оказания квалифицированной стоматологической помощи.

Мы гарантируем, что при хирургическом лечении применялись безопасные, сертифицированные и качественные конструкционные стоматологические материалы.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ

После проведенного хирургического вмешательства необходимо соблюдать следующие рекомендации:

1. Прием пищи возможен через 2-3 часа после операции, в течение суток не рекомендуется полоскать рот.
2. Возникшие болевые ощущения через 1-1,5 часа после операции являются нормой. Возможно их снятие болеутоляющими препаратами (согласно назначению лечащего врача). Первый прием лекарства возможен через 1-1,5 часа после операции, далее - по мере возникновения боли, до 3-4 раз в день.
3. Небольшое кровотечение является нормальным в течение первых суток после операции. Кровоточивость может быть остановлена с помощью компрессии (накусывания, прижатия к ране стерильной марлевой салфетки) с одномоментным прикладыванием холода в течение 20 минут. Если продолжается выраженное кровотечение, следует обратиться к лечащему врачу.
4. На следующий день после операции появится отек, который будет увеличиваться в течение трех дней, а на 4-5 день начнет спадать. Для уменьшения отека рекомендуется в течение первых трех-пяти часов после операции прикладывать холод на область, соответствующую вмешательству (10 минут держать лед, затем на 15 минут перерыв, затем снова лед, и так далее).
5. На следующий день после операции и в течение последующих 7 дней рекомендуется после приема пищи полоскать рот 0,05% раствором хлоргексидина (не разбавляя) (3-4 раза в день).
6. В течение 1-й недели после оперативного вмешательства необходимо соблюдать жидкую диету. Не рекомендуется жевать на стороне операции. Чистку зубов необходимо проводить с особой осторожностью. Исключить физические нагрузки, а также принятие горячей ванны, посещение бани, сауны. Не курить и не употреблять спиртные напитки. Для улучшения заживления наносить 2 раза в день на операционную рану бальзамы, гели для десен, содержащие антибактериальные, противовоспалительные, ранозаживляющие компоненты.
7. Последующие 2 недели принимать мягкую, не горячую и не острую пищу.
8. В течение 1 месяца после операции воздержаться от перелетов на самолете, от занятий дайвингом и подводным плаванием.
9. Являться на прием к лечащему врачу согласно назначению.

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ СИНУС-ЛИФТИНГА (ДОПОЛНИТЕЛЬНО К РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПОСЛЕ ОПЕРАЦИИ ИМПЛАНТАЦИИ)

1. В течение двух недель нельзя сморкаться, чихать можно только с открытым ртом;
2. Спать на высокой подушке (в течение двух недель);
3. Исключить резкие движения головы;
4. В первые 2-3 дня после операции незначительное кровотечение из носа является нормой.

По вопросам качества проведенного хирургического лечения Вы можете обращаться к заведующему отделением.

Мы заинтересованы в качественном оказании медицинской помощи и ценим мнение пациентов о нашей работе.

Все замечания и предложения Вы можете направить на электронную почту sp56@zdrav.mos.ru
или сайт <https://sp56.mos.ru>